Полный курс вакцинации формирует иммунитет у 95% привитых

Как защититься от кори?

Вакцинация против кори – это самый эффективный способ профилактики

Полный курс вакцинации, состоящий из двух доз, формирует стойкий, длительный иммунитет в отношении кори.

Вакцинация детей:

- первая доза — в 12 месяцев
- вторая доза — в 6 лет

Взрослые подлежат вакцинации, если:

- нет информации о прививках против кори
- не болели корью
- не были привиты или привиты однократно

Вакцинация взрослых:

- предполагает введение двух доз вакцин с интервалом не менее 3 месяцев
- проводится в возрасте до 35 лет, декретированным контингентам — до 55 лет

КОРЬ

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи



ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи



Источник инфекции — больной человек

Инкубационный период -

от 7 до 21 дня (чаще 10-14 дней)

Ведущий путь передачи:

- воздушно-капельный

Корь крайне заразное заболевание

В результате контакта с больным заражается не менее 90% людей без специфического иммунитета

Симптомы кори:

✓ **Катаральный период**

кашель и/или насморк, конъюнктивит, температура 38°С и выше, слабость, пятна на слизистой полости рта (Бельского-Филатова-Коплика)

✓ **Период высыпаний**

поэтапное появление пятнистно-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня заболевания

- 1 день - лицо, шея
- 2 день - туловище
- 3 день - ноги, руки

✓ **Период пигментации**

сыпь начинает приобретать коричнево-бурый цвет и постепенно исчезает в том же поряде, в котором появилась

Больной становится заразным за несколько дней до появления симптомов

Осложнения кори:



- Ларингит
- Трахеобронхит
- Пневмония
- Отит
- Энцефалит
- Менингит

Противоэпидемические мероприятия в очаге кори:



Изоляция больного

заболевший корью должен быть отстранен от здоровых лиц на срок не менее 5 дней с момента появления сыпи



Дезинфекция воздуха и помещений

частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств



Наблюдение за контактными

за контактными лицами, непривитыми и не болевшими корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня



Экстренная вакцинация

проводится контактным лицам, ранее не болевшим, непривитым или привитым однократно в течение 72 часов после выявления больного. При расширении границ очага срок иммунизации может быть продлен до 7 дней