Лучшая профилактика — защита от насекомых и клещей

- При посещении лесопарковых зон и водоемов носить закрытую одежду
- Использовать репелленты и акарицидные средства
- Использовать специальные сетки для окон и дверей, при необходимости — антимоскитные пологи над кроватью
- Использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях
- Не создавать благоприятные условия для выплода комаров во дворах и на дачных участках
- Избегать нахождения в заболоченных местах



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

Острая вирусная инфекция, которая передается людям при укусе комаров и при присасывании клещей



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

Вирусное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи, протекающее у человека в виде острой лихорадки с симптомами общей интоксикации, в ряде случаев с поражением центральной нервной системы

Возбудитель инфекции — вирус Западного Нила

Где встречается:

Природные очаги лихорадки Западного Нила зарегистрированы более чем в 90 странах на территории Африки, Европы, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии.

В России эндемичными территориями считаются южные регионы, случаи местного заражения также регистрируются в Центральной части России и Поволжье.

Инкубационный период
от 2 дней до 3 недель, в среднем 3 – 8 дней

Механизм передачи — трансмиссивный

Вирус передается при укусе различных видов комаров и при присасывании клещей

Основной источник инфекции

Птицы водно-околоводного комплекса, синантропные птицы (голуби, вороны)

К категориям повышенного риска заражения относятся

- ✓ Рыбаки и охотники
- ✓ Лица, занятые сельскохозяйственной деятельностью, в том числе на дачных и приусадебных участках
- ✓ Лица, проживающие по берегам рек и озер, рыборазводных прудов, в поймах, дельтах рек, где живет большое количество водоплавающих птиц и комаров
- ✓ Лица, посещающие территории с высокой численностью комаров и клещей

Симптомы:

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Общая слабость
- ✓ Интенсивная головная боль
- ✓ Боль в глазных яблоках
- ✓ Боль в мышцах и суставах

Тяжелые нейроинвазивные формы заболевания сопровождаются симптомами:

- ✓ Рвота
- ✓ Головная боль
- ✓ Ригидность мышц шеи
- ✓ Заторможенность
- ✓ Дезориентация
- ✓ Тремор и судороги
- ✓ Мышечная слабость

При тяжелых формах лихорадки Западного Нила летальность может достигать 50%