При укусе животного

- Незамедлительно промыть рану с мылом под проточной водой в течение не менее 15 минут
- Края раны обработать 70% спиртом или 5% водно-спиртовым раствором йода
- В кратчайшие сроки обратиться в медицинскую организацию для проведения лечебно-профилактической иммунизации

Лечебно-профилактическая иммунизация

- Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90
- При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин

Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше вероятность благоприятного исхода



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте

БЕШЕНСТВО

Особо опасная вирусная инфекция с высокой летальностью



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

БЕШЕНСТВО

Это особо опасная вирусная инфекция, передающаяся человеку от теплокровных животных, проявляющаяся тяжелым поражением центральной нервной системы и заканчивающаяся летальным исходом в 100% случаев




Источник инфекции — собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши и некоторые другие животные

Основной механизм передачи — контактный

Инфицирование происходит



При укусе, оцарапывании или ослюнении слизистых и поврежденных кожных покровов больным животным



При попадании слюны и (или) другого вируссодержащего материала на слизистые оболочки или поврежденные кожные покровы



При ранении предметами, загрязненными инфицированной слюной

Группы риска

- ✓ **Ветеринары**
- ✓ **Егеря, охотники, лесники**
- ✓ **Лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных**
- ✓ **Работники бойни**
- ✓ **Таксидермисты**
- ✓ **Сотрудники лабораторий, работающие с вирусом бешенства**



Инкубационный период
от нескольких дней до нескольких лет, обычно 2–3 месяца, редко более 1 года



Вероятность заражения зависит от дозы вируса и локализации укусов, особенно опасны обширные и множественные раны, укусы головы, лица и кистей рук.



Прогноз бешенства крайне неблагоприятный: после появления симптомов бешенство заканчивается летальным исходом в 100% случаев

Симптомы:

- ✓ **Отечность и покраснение в области зажившей раны**
- ✓ **Лихорадка и головная боль**
- ✓ **Тревожность и раздражительность**
- ✓ **Нарушения поведения и сна**
- ✓ **Галлюцинации и бред**
- ✓ **Гиперсаливация и гидрофобия**
- ✓ **Паралич мышц**

Меры профилактики:



Не контактировать с диким или бродячим животным



Не выпускать домашних животных на самовыгул



Не позволять домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными



Не приводить домой пойманных на улице бродячих животных



Регулярно делать прививку от бешенства домашним питомцам