ОСПА ОБЕЗЬЯН

Высококонтагиозная особо опасная вирусная инфекция, характеризующаяся множеством путей и факторов передачи

Эндемичные страны

Страны Центральной и Западной Африки в зоне пояса влажных тропических лесов

Источник инфекции — грызуны, приматы, больной человек

Заражение происходит

- При контакте с дикими животными, разделке их туш, употреблении в пищу мяса и субпродуктов без термической обработки
- При контакте с содержимым кожных элементов больного и вещами, контаминированными вирусами
- При поцелуях и любых видах сексуальных контактов
- Воздушно-капельно при длительном близком контакте с больным, имеющим очаги поражения в горле или на слизистых полости рта
- От матери к плоду через плаценту, а также во время родов

Симптомы



- **Лихорадка**
- **Головная боль**
- **Боль в мышцах**
- **Увеличение лимфатических узлов**
- **Кожные высыпания**

Меры профилактики при посещении эндемичных стран:

1. **Избегать контакта с дикими животными**
2. **Употреблять в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения**
3. **Избегать тесных контактов с местным населением**

! **По возвращении из эндемичных стран в случае появления недомогания обратиться к врачу и информировать его о факте пребывания на неблагополучной территории**

! **При контакте с людьми, прибывшими из эндемичных стран и ощущающими недомогание, пользоваться маской и соблюдать требования к гигиене рук**